

살균·살충제 (라3 + 아3 + 4a)

가스가마이신·발리다마이신-에이·클로티아니딘 액 제 (상 표) <b>플 세 트</b>	유효성분 : Kasugamycin .....	2.5%
	Validamycin A .....	5%
	Clothianidin .....	1%
	기 타 : 계면활성제, 안정제, 용제, 증량제 .....	91.5%
	계 통 : 트리아졸계+합성피레스로이드계	

**독 성 : 보통독성**

**【적용병해충 및 사용량】**

작 물 명	적용병해충	사용적기 및 방법	물20ℓ 당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
벼	잎 도 열 병	발병초 경엽처리	10mℓ	수확 30일전까지 사용	3회 이내
	목 도 열 병	출수 7일전 경엽처리			
	깨 씨 무 늬 병	발병초 7일간격 경엽처리			
	세균벼알마름병	출수직전부터 7일간격 경엽처리			
	잎집무늬마름병	유수형성기 및 수잉기 경엽처리	2500mℓ (0.8ℓ /10a)	수확 60일전까지 사용	1회 이내
	목도열병(무인항공기)	출수 7일전 경엽처리			
애벌구(무인항공기)	다발생기 경엽처리				

**【사용방법】**

1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.

**【특 징】**

1. 이 농약은 벼의 주요 병해충을 한번에 방제할 수 있는 살균, 살충제입니다.
2. 이 농약은 무인헬기를 이용한 살포에 적합한 약제입니다.

**⚠ 【안전 및 기타 주의사항】**



1. 이 농약은 약한 안자극이 있으므로 마스크, 보안경, 고무장갑, 방제복을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리시되 작업 후에는 물로 행구고, 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.

**【해독방법】**

1. 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내십시오.