

아미של브롬 · 디노테퓨란
 입상수화제
(상 표) 트레이온

유효성분 : Amisulbrom 4.2%
 Dinotefuran 10%
 기 타 : 계면활성제, 안정제, 증량제 85.8%
 계 통 : 혼합제(설폰아마이드계+네오니코티네이드계)

독 성 : 저독성



【적용병해충 및 사용량】

작 물 명	적용병해충	사용적기 및 방법	물20ℓ당 사용약량	사용량	
				시 기	횟 수
배 추	뿌 리 혹 병	정식전 육묘상 관주처리	400g (4mℓ/주)	정식기까지 사용	1회이내
	배 추 좀 나 방				
	벼 록 잎 벌 레				

【특 징】

1. 이 농약은 설폰아마이드계의 아미של브롬과 네오니코티노이드계 디노테퓨란의 합제로 생육단계에서 발생하는 병해와 충해를 동시에 방제 할 수 있는 약제로 기존약제와 교차저항성이 없어 우수한 효과를 나타냅니다.
2. 이 약제는 뿌리혹병 전문방제 약제인 아미של브롬을 포함하여 후면포자의 발아억제는 물론 유주자 유영저해 및 직접 사멸하는 효과가 우수하며, 특히 1차 침입 후 병원균의 변형체에서 발생하는 유주자를 효과적으로 저지시킵니다.
3. 이 약제는 식물체내로 높은 침투이행성을 가진 디노테퓨란을 포함하여 지상부를 가해하는 해충을 방제하고 약효가 오래 지속됩니다.
4. 후작물 및 주변 작물에도 안전하며 유용 토양미생물과 천적, 유용 곤충에도 영향이 거의 없습니다.

【사용방법】

1. 이 농약은 분진이 날리지 않는 입상수화제로 소정의 약을 물에 섞은 후 사용하십시오.
2. 육묘상 관주처리: 약제 250g을 물 12.5ℓ 에 희석한 후 128구 약 25상자에 육묘상 관주처리 하십시오.
3. 육묘상에서 뿌리혹병이 감염될 수 있으므로 주근보호를 위해 육묘기간 중 가급적 빠른 시일내에 관주하여 주십시오.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

1. 육묘상 처리 후 병해충 발생이 평년이상으로 대발생할 경우에는 적용대상 약제를 분담에 추가로 살포하여 주십시오.
2. 육묘상에 약제처리 후에는 관수를 하지 마십시오.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】



1. 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에서 살포하지 마십시오.