

아이소티아닐·클로티아니딘
입제
(상표) **빙고**

유효성분 : isotianil 1%
 clothianidin 0.5%
기 타 : 계면활성제, 점결제, 증량제 98.5%
계 통 : 혼합제(티아다이졸카복사마이드계+클로로니코티닐계)

독 성 : 저독성



【적용병해충 및 사용량】

작 물 명	적용병해충	사용적기 및 방법	사용량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
벼	깨 씨 무늬 병	이양당일 육묘상처리/ 파종시 육묘상 처리	50g/상자 (1kg/10a)	이양기까지 사용	1회 이내
	잎도열병·목도열병				
	벼물바구미				
	벼줄기굴파리				
	벼잎물가파리				
	흰잎마름병·키다리병				
	세균벼알마름병				
	애멸구	이양 7일전 육묘상처리			
이삭누룩병	파종시 육묘상처리				

- 【사용방법】** 1. 이 농약은 물에 희석하지 마시고 육묘상자에 약제를 직접 골고루 뿌리십시오.
 2. 모에 물기가 묻어있을 경우 잘 털어 주신 후 1,000㎡당 이양하고자 하는 육묘상자에 1kg의 약제를 이양 당일 육묘상자에 골고루 살포하시고, 잎에 묻은 약은 가볍게 털어 상토 위에 떨어지게 하십시오.
 3. 약제를 처리할 때와 처리한 후에는 모판에 물이 잠기지 않도록 주의하십시오.
 4. 이 농약은 이양 7일전부터 이양 당일까지 모판에 사용 가능합니다.

- 【특 징】** 1. 이 농약은 티아다이졸카복사마이드 계통의 살균제인 아이소티아닐과 클로로니코티닐계통의 살충제인 클로티아니딘의 합제로 약효 지속기간이 긴 살균살충제입니다.
 2. 이 농약은 침투이행성이 우수하고 장기간 효과가 지속되는 육묘상 처리제로서 벼 이양후 본답의 목도열병, 잎도열병, 애멸구, 벼줄기굴파리, 벼잎물가파리, 벼물바구미 등을 동시에 방제하는 생력화 약제입니다.
 3. 이 농약은 처리횟수와 살포량을 줄일 수 있어 효율적인 약제입니다.
 4. 이 농약은 유효성분이 서서히 유출되어 약해없이 안정된 약효를 보입니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

1. 육묘에 이슬이 맺혀 있을 경우에 사용하면 약해가 날 우려가 있으므로 이슬을 잘 털어주신 후 사용하십시오.
2. 밀파되거나 불량환경 등으로 인한 연약한 모, 도장한 모, 생육이 불량한 모나 이양적기를 지난모 등에 사용하거나 이상기온이 계속되어 뿌리의 생육이 나빠질 경우에는 약해가 발생할 수 있으니 사용하지 마십시오.
3. 미숙퇴비를 사용하여 가스장애가 우려되는 논이나 찬물이 나는 논, 염해가 우려되는 간척담에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
4. 병해충의 발생이 평년이상대발생할 경우 적용대상 약제를 본답에 추가로 살포하여 주십시오.
5. 이 약제를 파종시 육묘상 처리로 사용할 경우 입상형 증량상태를 사용하면 약해의 우려가 있으니 입상형 증량상태를 사용하는 곳에서는 이 약제를 절대 사용하지 마십시오.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】 1. 이 농약은 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.

2. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.

【등록회사】 빙고(동방아그로)