

스프레더스티커 분산성액제
(상표) 레이트론

유효성분 : spreader-sticker 77%
기 타 : 용제 23%

【적용대상별 안전사용기준】 독 성 : 저독성·어독성 II 급

작 물 명	적 용 대 상	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량(㎖)	사 용 량	사용시기 (~까지)	사용가능 횟수
감	전착효과(감나무주머니 깍지벌레)	사용할농약을희석한 후 경엽처리	5	-	발생초기	-
감귤	전착효과(귤응애)					
강낭콩	전착효과(파밤나방)					
고추	전착효과(탄저병)					
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워 포함)	전착효과(배추좀나방)					
녹두	전착효과(파밤나방)					
단감	전착효과(감나무주머니 깍지벌레)					
당근	전착효과(담배거세미나방)					
대추	전착효과(점박이응애)					
동부	전착효과(파밤나방)					
마늘	전착효과(파총채벌레)					
매실	전착효과(점박이응애)					
무	전착효과(배추좀나방)					
배	전착효과(꼬마배나무이)					
배추	전착효과(배추좀나방)					
복숭아	전착효과(점박이응애)					
사과	전착효과(겉무늬씩음병)					
살구	전착효과(점박이응애)					
순무	전착효과(배추좀나방)					
순무양배추(콜라비)						
양배추						
양파	전착효과(파총채벌레)					
완두	전착효과(파밤나방)					
인삼	전착효과(갈색날개매미충)					
자두·포도	전착효과(점박이응애)					
콩팥	전착효과(파밤나방)					
파(쪽파 포함)	전착효과(파굴파리)					

전착제

【사용방법】

1. 사용하고자 하는 약제를 미리 희석한 다음 그 용기에 소정량의 전착제를 첨가하고 잘 저어 뿌리십시오.

【특 징】

1. 이 약제는 대상 작물에 습전성 및 부착성을 좋게 하여 유효성분의 침투력을 증진시켜 약효를 향상시켜 주는 전착제입니다.
2. 적은 약량(물 20ℓ 당 5mℓ 희석) 희석액으로 강력한 전착효과를 발휘합니다.
3. 원예작물에 안전성이 높은 전착제입니다.
4. S.S 분무기 사용 시 살포 각도를 넓혀주므로 더 높은 약효를 발휘할 수 있도록 도와줍니다.
5. 거품 발생량이 적어 약제 희석이 편리합니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

1. 이 약제는 약효를 증진시켜주는 역할을 하는 전착제이므로, 이 약제만 단독 살포할 경우 약효 및 약효증진 효과가 없습니다.
2. 사과 개화기 및 유과기에 사용할 경우 동녹의 우려가 있으니 주의하십시오.
3. 털복숭아 등 털이 있는 핵과류의 유과기에 사용할 경우 약해의 우려가 있으니 주의하십시오.
4. 하우스 등 시설재배에서 전착제의 사용은 약제의 성분이 남을 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
5. 이 약제는 전착제로, 농약의 부착성을 좋게 하여 작물에 약제 성분이 남을 우려가 있으므로, 수확 14일 이내로는 이 약제를 함께 사용하지 마십시오.

⚠ 【주요 주의사항】



1. 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러들어갈 우려가 있는 지역에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오.

⚠ 【기타 주의사항】

1. 저온(영하 5℃ 이하)에서 장기간 보관 시 결빙되거나 점성이 높아질 수 있으므로 실온에서 보관하십시오.