

살균제 (아5)

이 품목은 등록회사에 따라 적용대상이 다르므로 반드시 포장지를 확인하십시오.

디메토모르프

수화제(25%·50%)
입상수화제

유효성분 : Dimethomorph (수화제)25%·50%, (입상수화제)50%
 기 타 : (수화제-25%)▲●계면활성제, ●보조제, ▲●증량제 75%
 (수화제-50%)분산제, 계면활성제, 증량제 50%
 (입상수화제)계면활성제, 접착제, 봉해제, 증량제 50%
 계 통 : 시나믹에시드계

【적용병해충 및 사용량】

[수화제-25%] 상표 : 젠토팜, 유일스피드, 임팩션, 미리스타 저독성

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
*●▲감 자	역 병	발병직전부터 10일간격	20g	수확 14일전까지 사용	4회이내
*●▲고추(단고추류포함)				수확 7일전까지 사용	2회이내
*●▲가 지	역 병	발병초 경엽처리	20g	수확 3일전까지 사용	2회이내
*●▲고추(잎)				수확 7일전 사용	1회이내
*●▲들 깨(잎)	역 병	발병초부터 7일간격	20g	수확 10일전까지 사용	3회이내
*●▲배 추				수확 14일전까지 사용	3회이내
*●▲상 추	노 균 병	발병초부터 10일간격	20g	수확 10일전까지 사용	1회이내
*●▲시금치				수확 14일전까지 사용	3회이내
*●▲오 이	역 병	발병초부터 7일간격	20g	수확 5일전까지 사용	3회이내
*●▲쪽 파				수확 7일전까지 사용	2회이내
*●▲황 기	역 병	발병초 10일간격	10g	수확 21일전까지 사용	3회이내
*●▲스타티스	역 병	발병초 7일간격	20g	-	-
*●▲숙 갓	노 균 병			수확 7일전까지 사용	2회이내
*●▲안개초	역 병	발병초 10일간격	20g	-	-
*●▲무화과	역 병			수확 14일전까지 사용	3회이내
*●▲양 파	노 균 병	발병초부터 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	
●포 도				발병초 10일간격	수확 21일전까지 사용
*●인삼	역 병	발병직전 10일간격	10g	수확 50일전까지 사용	1회이내
●들 깨(잎)	역 병	발병초 10일간격	20g	수확 10일전까지 사용	
*●▲멜론	노 균 병	발병초 7일간격	10g	수확 30일전까지 사용	
*●▲무			20g	수확 7일전까지 사용	
*●▲조	잎집무늬마름병	발병초 10일간격	10g	수확 21일전까지 사용	3회이내
*●▲청경채	노 균 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	2회이내
*●▲치커리					
*●▲겨자채	노 균 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	3회이내
*●▲고들빼기					
*●▲다채(비타민)	역 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	3회이내
*●▲대추					
*●▲더덕	노 균 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	2회이내
*●▲망고					
*●▲명아주	노 균 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	3회이내
*●▲순무양배추(콜라비)					
*●▲순무유채	노 균 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	2회이내
*●▲양상추					
*●▲열무	역 병	발병초 7일간격	20g	수확 14일전까지 사용	3회이내
*●▲오미자					
*●▲유자	역 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	3회이내
*●▲참다래(키위)					
천궁	잎마름병	발병초 7일간격	20g	수확 45일전까지 사용	1회이내

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
*●콩	노 균 병	발병초기 7일간격	20g	수확40일전까지 사용	2회 이내
*●패션프루트	역 병			수확 7일전까지 사용	3회 이내
*●해바라기	노 균 병	발생초기		수확 21일전까지 사용	
*●황기	역 병			수확 3일전까지 사용	
■참외	노 균 병	발병초기 7일간격		수확 5일전까지 사용	
■토마토	역 병			수확 5일전까지 사용	

[수화제-50%] 상표 : 임페투 저독성

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
고추(단고추류포함)	역 병	발병직전부터 10일간격	10g	수확 5일전까지 사용	2회 이내
고추(잎)		발병직전 경엽처리		수확 7일전까지 사용	1회 이내
감자		발병직전부터 7일간격		수확 14일전까지 사용	4회 이내
양파	노 균 병	발병초 7일간격		수확 7일전까지 사용	3회 이내
오이				수확 5일전까지 사용	
포도		발병초 10일간격		수확 21일전까지 사용	2회 이내
배추			수확 14일전까지 사용	3회 이내	
인삼	역 병	발병직전부터 10일간격	5g		수확 30일전까지 사용

[입상수화제] 상표 : 엑스포플러스, 아리탑케어 저독성

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
오이	노 균 병	발병초 7일간격	10g	수확 3일전까지 사용	2회 이내
배추		발병초 10일간격		수확 14일전까지 사용	3회 이내
감자	역 병	발병직전 7일간격			수확 7일전까지 사용
고추(단고추류포함)		발병직전 10일간격			
양파	노 균 병	발병초 7일간격		수확 7일전까지 사용	3회 이내

[특 징]

[수화제·입상수화제] 1. 이 농약은 병원균의 생합성 저해로 세포벽 형성을 저해하거나 세포벽 파괴로 약효를 발휘합니다.

2. 이 농약은 침투이행성이 우수하며 예방 및 치료효과를 겸비한 약제입니다.

[입상수화제] 1. 이 농약은 분진이 적은 입상수화제 제형으로 사용이 편리합니다.

[수화제] 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.

⚠️ [약효·약해에 관한 주의사항]

1. 내성균 출현을 방지하기 위하여 지나친 연용을 피하고 다른 약제와 교대로 살포하십시오.
2. 이 농약은 중복살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복살포를 하지 마십시오.

⚠️ [안전 및 기타 주의사항]



[입상수화제] 1. 이 농약은 약한 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑으로 착용하고 바람을 등지고 뿌리시되, 작업 후에는 입안을 물로 행구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.

[해독방법] [입상수화제] 1. 눈에 들어 갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내십시오.

[등록회사] [수화제-25%]젠토팜(●아그리젠토) 유일스피드(▲유일) 임팩션(▲KC생명과학) 미리스타(*천치인바이오텍) [수화제-50%]임페투(로탐)
[입상수화제]엑스포플러스(KC생명과학) 아리탑케어(KC생명과학)