

가스가마이신 액제
입상수화제

유효성분 : kasugamycin (액제)2.3%, (입상수화제)10%
 기 타 : (액제)계면활성제, 부동제, 응제, pH조절제, 방부제, 소포제 97.7%
 (입상수화제)계면활성제, 점결제, 보조제, 안정제, 증량제 90%
 계 통 : 항생제

【적용병해충 및 사용량】

[액제] 상표: 가스가민 저독성

작물명	적용병해		사용시기 및 방법	물20ℓ당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량		안 전 사 용 기 준	
					약량	살포량	시 기	횟 수
벼	도열병	모도열병	발병직전 또는 발병초기	20ml	80ml	80ℓ	수확 14일 전까지 사용	5회 이내
		잎도열병	본논초기 : 발병직전 또는 발병초기		80~100ml	80~100ℓ		
		이삭도열병	본논중·후기 : 발병직전 또는 발병초기					
	갈색잎마름병	이삭패기직전 및 이삭팬후 각 1회	140~160ml		140~160ℓ			
	세균벼알마름병	출수직전부터 7일간격						
배추	무름병	발병직전부터 7일간격		약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림	수확 3일전까지 사용	4회이내		

[입상수화제] 상표: 메가폰 저독성

작물명	적용병해		사용시기 및 방법	물20ℓ당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
					시 기	횟 수
고추(단고추류 포함)	세균점무늬병	발병초 7일간격	20g	수확 2일전까지 사용	3회 이내	
배추	노균병	발병초 10일간격		수확 3일전까지 사용	4회 이내	
	무름병	발병직전부터 7일간격		수확 7일전까지 사용		
감자	무름병	발병직전 7일간격		수확 21일전까지 사용		4회 이내
강활	궤양병	발병초 7일간격		수확 14일전까지 사용		
마늘	무름병·잎집씩음병	발병초 10일간격		수확 7일전까지 사용		3회 이내
인삼	점무늬병	발병초 7일간격		수확 14일전까지 사용		
양배추	검은썩음병	발병직전 7일간격		수확 7일전까지 사용		3회 이내
	무	노균병		발병초 10일간격		
녹색꽃양배추(브로콜리)	무름병	발병직전부터 7일간격		수확 7일전까지 사용		3회 이내
딸기	세균모무늬병	발병초 10일간격	수확 3일전까지 사용			
담배	줄기속마름병	적심후 7일간격	25g	-		
감초	세균점무늬병	발병초 7일간격	20g	수확 14일전까지 사용	1회이내	
갯근대·냉이	무름병	발병 직전부터 7일간격		수확 21일전까지 사용		
당근·미나리		발병초 7일간격		수확 14일전까지 사용		
방울다다기양배추		수확 7일전까지 사용		4회이내		
비트·숙갯		수확 14일전까지 사용				
상추(양상추포함)		수확 7일전까지 사용		1회이내		
셀러리(양미나리)		수확 14일전까지 사용				
양배추		발병초 7일간격		수확 7일전까지 사용		3회이내
청경채		발병직전 7일간격		수확 21일전까지		
파(쪽파포함)		발병초 7일간격		수확 7일 전까지		2회 이내
부추		무름병	발병초 7일간격	발생초		
삼주	세균썩음병	발병초 7일간격				
감귤	궤양병	새순군기전부터 14일간격				
고수	세균잎썩음병	발생초				

살균제

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워포함)	무 림 병	발생초	20g	수확 7일 전까지	3회 이내
당 근	세균잎마름병			수확 14일 전까지	1회 이내
순무양배추(콜라비)	검은썩음병				3회 이내
양 파	구썩음병			발생직전 7일간격	수확 7일전까지
치 커 리	무 림 병	발생초기		수확 14일 전까지	1회 이내
토 마 토 (방울토마토포함)	풋 마 림 병	발생직전 7일간격 관주처리	20g(250ml/주)	수확 3일전까지	3회 이내
오 이	세균모무늬병	발생초기 7일간격 경엽처리	20g	수확 5일전까지	

【사용방법】

[액제·입상수화제] 1. 장마철에는 비가 멈춘틈을 타서 약을 뿌려 방제시기를 놓치지 않도록 하십시오.

【특징】

[액제·입상수화제] 1. 이 농약은 농업용 항생물질로서 예방 및 치료효과를 동시에 나타냅니다.

2. 이 농약은 침투이행성이 우수하여 이미 식물조직에 침투한 균사의 신장을 억제시킴으로써 초기병반형성 및 2차진전을 저해합니다.

[액제] 1. 빠른 침투이행성으로 비가 잦은 장마철에도 우수한 효과를 나타냅니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

[입상수화제] 1. 이 농약은 중복살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복살포를 하지 마십시오

2. 작물이 연약할 때나 이상기후(이상고온, 이상저온, 과습, 건조 등)에서는 약해를 받을 수 있으니 사용을 금합니다.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】

[액제] 1. 이 농약은 영하5도(℃) 이하에서는 얼 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 영하 5도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.