

**디메토모르프 수화제**  
액상수화제

유효성분 : Dimethomorph ..... (수화제)25%, (액상수화제)18%  
기 타 : (수화제)계면활성제, 보조제(안정제), 증량제 ..... 75%  
(액상수화제)계면활성제, 소포제, 증점제, 방부제, 증량제 ..... 82%  
계 통 : 시나믹에시드계

**【적용병해충 및 사용량】 [수화제] 상표 : 포름, 더존, 온저내 저독성**

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
감 자 고 추(단고추류 포함)	역 병	발병직전부터 10일간격	20g	수확 14일전까지 사용	4회이내
				수확 7일전까지 사용	2회이내
인 삼 무 화 과	역 병	발병초 10일간격	10g	수확 50일전까지 사용	3회이내
				수확 14일전까지 사용	
오 이 들 깨 ( 잎 )	노 균 병	발병초부터 7일간격	20g	수확 5일전까지 사용	1회이내
				발병초 10일간격	
상 추 쪽 파	노 균 병	발병초부터 7일간격	20g	수확 10일전까지 사용	2회이내
				수확 7일전까지 사용	
시 금 황 기	노 균 병	발병초 10일간격	10g	수확 14일전까지 사용	3회이내
				수확 21일전까지 사용	
⊙ 포 양 파	역 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	-
				-	
안 개 배 추	노 균 병	발병초 10일간격	20g	수확 14일전까지 사용	3회이내
				-	
스 타 ⊕ 참	노 균 병	발병초 7일간격	20g	수확 3일전까지 사용	3회이내
				수확 5일전까지 사용	
⊕ 토마토(방울토마토포함)	역 병	발병초 7일간격	20g	수확 7일전까지 사용	2회이내
				수확 30일전까지 사용	
숙 갓 멜 론	노 균 병	발병초 7일간격	10g	수확 7일전까지 사용	1회이내
				수확 21일전까지 사용	
무 조(동방 제외)	노 균 병	발병초 10일간격	10g	수확 21일전까지 사용	3회이내
				수확 7일전까지 사용	
청 경 치 커	노 균 병	발병초 7일간격	20g	수확 3일전까지 사용	2회이내
				수확 7일전까지 사용	
가 지 고 추 ( 잎 )	역 병	발병초 경엽처리 발병직전 경엽처리	20g	수확 7일전까지 사용	1회이내
				발병초 10일간격	
⊕ 참 겨 자 고 들 다 채 (비타민)	노 균 병	발병초 경엽처리	20g	수확 7일 전까지	3회이내
				발병초 10일간격	
대 추 더 덕	역 병	발병초 7일간격 경엽처리	20g	수확 14일 전까지	3회 이내
				수확 7일 전까지	
명 아 순무양배추(콜라비)	노 균 병	발병초 7일간격 경엽처리	20g	수확 45일 전까지	1회 이내
				수확 40일 전	
순 무 양 상 열 무	노 균 병	발병초 7일간격 경엽처리	20g	수확 7일 전까지	2회 이내
				수확 7일 전까지	
오 미 유 자 참 다 래 (키위)	역 병	발병초 7일간격 경엽처리	20g	수확 14일 전까지	3회 이내
				수확 7일 전까지	
천 궁	노 균 병	발병초 7일간격 경엽처리	20g	수확 45일 전까지	1회 이내
				수확 40일 전	
패 션 해 바 황 기	노 균 병	발병초 7일간격 경엽처리	20g	수확 7일 전까지	3회 이내
				수확 21일 전까지	

[액상수화제] 상표 : 페스티벌 저독성

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ 당 사용약량	안 전 사 용 기 준		
				시 기	횟 수	
고 추(단고추류 포함)	역 병	장마직전부터 7일간격	20mℓ	수확 7일전까지 사용	2회이내	
오 이	노 균 병	발병초부터 7일간격		수확 2일전까지 사용	3회이내	
포 도		발병초 10일간격		수확 30일전까지 사용		
양 파		발병초 7일간격		수확 7일전까지 사용		
장 미				-	-	
인 삼	역 병	발병초 10일간격		20mℓ	수확 60일전까지 사용	3회이내
머 루	노 균 병	발병초 10일간격			수확 30일전까지 사용	
근 대 · 썩 갓		발병초 7일간격		수확 7일전까지 사용	2회이내	
고 들 배 기					3회이내	
고 추 ( 잎 )	역 병	발병직전 경엽처리		10mℓ	1회이내	
배 추	노 균 병	발병초 7일간격	수확 21일전까지 사용		3회이내	
시 금 치			수확 7일전까지 사용			
파 ( 쪽 파 포 함 )			수확 14일전까지 사용		2회이내	
갓			수확 7일전까지 사용		3회이내	
냉 이			수확 14일전까지 사용			
녹색꽃양배추(브로콜리)			수확 7일전까지 사용		2회이내	
들 깨 ( 잎 )			수확 14일전까지 사용			
로 케 트 ( 루 꼴 라 )			수확 7일전까지 사용		3회이내	
배암차즈기(곰보배추)			수확 14일전까지 사용			
부 추						
손 무 유 채						
꽃 양 배 추 ( 잎 )		발생초기				
블 루 베 리	역 병	발병초 10일간격	20mℓ	수확 7일전까지 사용	2회이내	
상 추(양상추포함)	노 균 병	발병초 7일간격		3회이내		
상 추	역 병	발병초기				
양 배 추	노 균 병			수확 21일전까지 사용	2회이내	

[사용방법]

[수화제] 1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.(10a당 살포물량 : 포도(200~300ℓ), 채소류/화훼류(150~200ℓ), 인삼(150~250ℓ)(팜한농에 한함), 과수(200~450ℓ))

[특 징]

[수화제·액상수화제] 1. 이 농약은 병원균의 생합성 저해로 세포벽 형성을 저해하거나 세포벽 파괴로 약효를 발휘합니다.

2. 이 농약은 침투이행성이 우수하며 예방 및 치료효과를 겸비한 약제입니다.

[액상수화제] 1. 이 농약은 약흔을 남기지 않아 고품질 농산물을 생산할 수 있습니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

[수화제·액상수화제] 1. 내성균 출현을 방지하기 위하여 지나친 연용을 피하고 다른 약제와 교대로 살포하십시오.

2. 이 농약은 중복살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복살포를 하지 마십시오.

[안전 및 기타 주의사항]



[액상수화제] 1. 이 농약은 약한 인자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑으로 착용하고 바람을 등지고 뿌리 시되, 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.

이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.

【등록회사】 [수화제]포룸(®동방아그로) 더존(팜한농) 온저내(®한얼사이언스) [액상수화제]페스티벌(동방아그로)